



Lactancia materna exclusiva en niñas y niños menores de seis meses




A nivel nacional el 29.7% de niños y niñas menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, recomendada durante los primeros seis meses de vida. Los departamentos que presentan porcentajes altos de lactancia exclusiva son: Ocotepeque (61%), La Paz (53.8%), Lempira (52.5%) e Intibucá (47.3%). Los departamentos con menores porcentajes de lactancia materna exclusiva son: Cortés (16.6%), Valle (18.5%) y Colón con 20.3%.

Niños y niñas de 12 a 23 meses de edad que han recibido todas las vacunas




Prevalencia de diarrea en niños y niñas menores de 5 años



La prevalencia de diarrea ha disminuido de 22.5% en el año 2001 a 15.5% en el año 2005.

Niños y niñas menores de 5 años con bajo peso al nacer



A nivel nacional el 7.6% de los niños y niñas pesaron al nacer menos de 2.5 Kg, el área urbana presenta un 7.1% y el área rural un 8.1%.

GLOSARIO

- **Tasa de mortalidad infantil:** es la probabilidad de morir durante el primer año de vida.
- **Tasa de mortalidad en menores de 5 años:** es la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años.
- **Prevalencia de infecciones respiratorias agudas:** es el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que estuvo enfermo con tos acompañada de respiración rápida y agitada o dificultad para respirar durante las dos semanas que precedieron la encuesta.
- **Prevalencia de anemia:** Porcentaje de niños y niñas de 6 a 59 meses de edad, que al momento de medirles la hemoglobina resultaron con anemia. La anemia es una condición en la cual los niños y niñas de 6 a 59 meses presentan un nivel de hemoglobina por debajo de 11.0 gramos por decilitro (g/dl) al nivel del mar.
- **Lactancia materna exclusiva:** Niños y niñas que son alimentados por lactancia materna exclusiva (sin líquidos o sólidos complementarios) durante los primeros seis meses de vida.
- **Niños y niñas menores de 5 años con bajo peso al nacer:** Es el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que al nacer pesaron menos de 2.5 kg.



Instituto Nacional de Estadística, Honduras
Lomas del Guajardo, Edificio Plaza Guajardo, 5to piso, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Apartado Postal: 9412. Teléfonos: (504) 239-7154
239-7161 / 239-7194 Fax: (504) 221-2908
web: www.ine-hn.org info@ine-hn.org




Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer Honduras



INDICADORES DE SALUD INFANTIL

2008


El Sistema de Indicadores de Niñez, adolescencia y mujer, ChildInfoHonduras, fue creado con el propósito de monitorear el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la situación de la niñez, la adolescencia y la mujer hondureña. El Instituto Nacional de Estadística levantó la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA en el año 2005-2006, con ésta encuesta se obtuvieron datos para la generación de indicadores de las condiciones de salud de la mujer de 15 a 49 años y las condiciones nutricionales de los niños menores de 5 años. Con base a estos resultados se presentan algunos indicadores que muestran las condiciones de la salud infantil.



La tasa de mortalidad infantil a nivel nacional ha disminuido de 34.0 por mil nacidos vivos para el año 2001 a 25.0 para el año 2005-2006.

Por área de residencia, el descenso es de 5 puntos en ambas áreas, en el área rural el descenso fue de 38.0 por mil nacidos vivos en el año 2001 a 33.0 en el año 2005, en el área urbana el descenso fue de 29.0 por mil nacidos vivos a 24.0 por mil nacidos vivos.


Tasa de mortalidad en menores de 5 años




La tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años ha disminuido de 45 por mil nacidos vivos para el año 2001 a 30 para el año 2005-2006.

La mortalidad en los primeros 5 años de vida es mayor en la zona rural que en la urbana (43 versus 29 por mil nacidos vivos para el año 2005-2006).

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por departamento




Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños y niñas menores de 5 años



La prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas ha disminuido de 48.6 en el año 2001 a 11.4 para el año 2005.

Prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses de edad



La prevalencia de anemia a nivel nacional en los niños y niñas de 6 a 59 meses de edad es de 37.3%, para el área urbana es del 33.0% lo que representan que la tercera parte de la población tiene anemia en ese grupo de edad o sea que 3 de cada 10 niños tienen anemia, en el área rural 4 de cada 10 niños tienen anemia.